

# Echinacin® Tabletten

**MADAUS**

Tabletten

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

### Echinacin® Tabletten Madaus

Tabletten

Zur Anwendung bei Kindern über 12 Jahren und Erwachsenen

Wirkstoff: Purpursonnenhutkraut Presssaft, getrocknet

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen *Echinacin® Tabletten Madaus* jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind *Echinacin® Tabletten Madaus* und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von *Echinacin® Tabletten Madaus* beachten?
3. Wie sind *Echinacin® Tabletten Madaus* einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind *Echinacin® Tabletten Madaus* aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. WAS IST ECHINACIN® TABLETTE MADAUS UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

*Echinacin® Tabletten Madaus* sind ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten.

Anwendungsgebiete:

Unterstützende Behandlung von wiederkehrenden Infekten im Bereich der Atemwege und der ableitenden Harnwege.

*Hinweis:*

Bei Fieber, Atemnot sowie länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON ECHINACIN® TABLETTE MADAUS BEACHTEN?

*Echinacin® Tabletten Madaus* dürfen nicht eingenommen werden,

- bei einer Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler.

Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anzuwenden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen (Leukosen), rheumatischen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), multipler Sklerose, AIDS-Erkrankungen, HIV- Infektion und anderen Autoimmunerkrankungen

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von *Echinacin® Tabletten Madaus* ist erforderlich,**

- bei Kindern

Wegen nicht ausreichend vorliegenden Untersuchungen mit diesem Arzneimittel bei Kindern soll dieses Arzneimittel bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Bei Einnahme von *Echinacin® Tabletten Madaus* mit anderen Arzneimitteln:**

Eine Wechselwirkung mit anderen Medikamenten ist nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Wegen nicht ausreichender Untersuchungen soll das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von *Echinacin® Tabletten Madaus*

Dieses Arzneimittel enthält Sorbitol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Anwendung bis zu 0,23 g Sorbitol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht bei jugendlichen und erwachsenen Patienten mit angeborener Fructose-Unverträglichkeit. Für diese Patienten ist die Anwendung des Arzneimittels nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt zulässig.

### 3. WIE SIND ECHINACIN® TABLETTE MADAUS EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie *Echinacin® Tabletten Madaus* immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Kinder ab dem 12. Lebensjahr und Erwachsene 3-4 mal täglich 1 Tablette.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!



MADAUS



# Echinacin® Tabletten

**MADAUS**

Tabletten

MADAUS

## Art der Anwendung

Die Tabletten werden mit Flüssigkeit (z.B. 1 Glas Wasser) eingenommen. Die Tabletten können jedoch auch gelutscht oder zerkaut werden. Die Einnahme ist unabhängig von den Mahlzeiten.

## Dauer der Anwendung

*Echinacin® Tabletten Madaus* sollten ununterbrochen nicht länger als 8 Wochen eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von *Echinacin® Tabletten Madaus* zu stark oder zu schwach ist.

## Wenn Sie eine größere Menge *Echinacin® Tabletten Madaus* eingenommen haben, als Sie sollten:

Von den pflanzlichen Bestandteilen sind keine Vergiftungsscheinungen zu erwarten

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheke.

## 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können *Echinacin® Tabletten Madaus* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandlerter von 10

Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100

Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000

Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000

Sehr selten: weniger als 1 Behandlerter von 10.000

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

## Mögliche Nebenwirkungen:

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, sehr selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## 5. WIE SIND ECHINACIN® TABLETTE MADAUS AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton / Bliester nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

## Aufbewahrungsbedingungen:

Das Arzneimittel ist nach Anbruch 8 Wochen haltbar.

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### Was *Echinacin® Tabletten Madaus* enthält:

Der Wirkstoff ist: Purpursonnenhutkraut Presssaft, getrocknet  
1 Tablette enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 100 mg getrockneter Presssaft aus frischem blühendem Purpursonnenhutkraut (22-65:1)

Die sonstigen Bestandteile sind:

Hochdisperses Siliciumdioxid, Sorbitol (Ph. Eur.), Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium 2 H<sub>2</sub>O, Calciumalkanoat (C<sub>16</sub>-C<sub>24</sub>)

Hinweis für Diabetiker: 1 Tablette enthält 232,5 mg Sorbitol (entsprechend 0,02 BE)

### Wie *Echinacin® Tabletten Madaus* aussehen und Inhalt der Packung:

Originalpackungen mit 50 [N1] oder 100 [N3] hellbraun geprenkelten Tabletten.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

MADAUS GmbH

51101 Köln

Tel.: 02 21 / 89 98-0

Fax: 02 21 / 89 98-711

e-mail: info@madaus.de

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2008.**

